



Aliette® Express

Coníferas, árboles, arbustos y césped

Aliette® Express

Coníferas, árboles, arbustos y césped

Aliette Express

Coníferas, árboles, arbustos y césped

Fungicida sistémico
Granulado dispersable en agua (WG)

Composición:
Fosetil-AL : 80 % p/p

Nombre registrado: Aliette WG
Numero de registro: 15907
Registrado por Bayer Cropscience S.L.

Autorizado en Jardín Exterior Domestico

Contiene hidróxido sódico

ADVERTENCIA :

Las recomendaciones o información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

PROTEGE CONTRA

El desecamiento de las coníferas,
Fitophthora de los árboles y
Pythium en céspedes



DOBLEMENTE Sistémico ASCENDENTE Y DESCENDENTE

Es absorbido por las hojas o por
las raíces, protege toda la planta

Para 30 m de seto
Hasta 250 m² de césped

Aliette Express

Coníferas, árboles, arbustos y césped

Indicaciones de peligro:

H319 - Provoca irritación ocular grave.
EUH 401 - A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Consejos de Prudencia:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 Llevar guantes de protección.
P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P305 + P351+ P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P309 + P311 EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales. Depositelo en los puntos de recogida: SIG Punto Verde.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.



ATENCIÓN

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente
La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos, conjuntivitis. Náuseas, vómitos. Irritación del tracto respiratorio, tos.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
TEL. 91-5620420

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Clasificaciones para fauna:

Mamíferos: A / Aves: A / Peces: A / Abejas: Compatible con las abejas.

Características

KB Aliette Express es un fungicida sistémico para la protección de las coníferas (arizónicas, cipreses, tuyas...), manzanos, perales y de otros frutales de pepita contra el marchitamiento provocado por un hongo parásito (fitophthora cinnamoni) que ataca las raíces y el cuello provocando gravísimos daños en la parte aérea.
También, es el producto ideal para combatir el pythium (manchas amarillas) de los céspedes. Además, permite luchar contra el mildiú de la fresa y la gomosis parasitaria de los cítricos así como contra los mildiús de cucurbitáceas (melón, pepino, calabacín, etc...)
Por ser sistémico, es absorbido por las raíces y/o por las hojas según como se aplique y después, transportado a toda la planta por la savia.

Periodo de empleo:

E F M A M J J A S O N D

Modo de empleo:

- Rellenar el pulverizador con el volumen de agua necesario
- Echar despacio la dosis de gránulos dispersables y dejarlos impregnarse
- Agitar para obtener una mezcla homogénea
- Tratar según las indicaciones dadas en el cuadro de dosis y periodo de empleo

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Recomendaciones de empleo:

- Para conseguir una actuación eficaz del producto, deben efectuarse las aplicaciones durante el periodo de crecimiento activo de la planta.
 - No mezclar este producto con productos a base de "Dicofol" o cobre, ni tampoco con abonos líquidos o solubles.
- Plazo de seguridad entre la última aplicación y la recolección: 15 días para todos los cultivos autorizados excepto para fresaes que será 7 días.

Práctico

KB Aliette® Express se compone de micro granulados dispersables que facilitan la preparación del caldo y de hecho mejora la calidad de la suspensión: más homogénea, con una mejor repartición de las partículas.

Aplicaciones autorizadas

1 dosificador lleno = unos 15 g

Cultivos	Enfermedades	Dosis y periodo de empleo
Coníferas	Desecamiento debido a fitophthora	Aplicación al suelo, con fuerte riego posterior. Para setos: 10g para 10 l de agua y por metro lineal. Para árboles aislados: 15g por árbol en 10 l de agua. En cualquier caso, realizar tres aplicaciones: Abril - Mayo - finales de Septiembre
Céspedes (deportivos o de esparcimiento)	Pythium o fitophthora (manchas amarillas)	- 12 a 24 g / 10 m ² en 5 l de agua. - En curso de vegetación, repetir a los 25 días. Cada año tratar en primavera y principios de verano.
Cítricos	Gomosis parasitaria (podredumbre del cuello y de la corteza) / Aguado	- Pulverización foliar a 2,5 g por litro de agua. - Tratar durante Abril o Mayo. En caso de síntomas de gomosis, repetir en Junio.
Fresa	Mildiú fitophthora cactorum (ajamiento de las hojas y desecación de las frutas) / Bacteriosis	- Antes de la plantación: mojar las plantas con 2,5 g por litro de agua, durante 15 mn. - Durante la vegetación, en primavera: pulverización foliar a 3 g/l de agua y por 10 m ² .
Peral - Manzano	Fitophthora cactorum (podredumbre) / Bacteriosis (desecación)	- 3 tratamientos durante la vegetación (principio, mitad y fin) - Pulverización foliar con 2,5 g. / litro de agua.
Cucurbitáceas (melón, calabacín, calabaza, pepino...)	Mildiú	Riego del cuello: 10g en 2 o 3 litros de agua por m ² .

Utilizar la cucharilla dosificadora graduada



Distribuido por: Ibercampo, S.L.
C/ Cavanilles, 32
- E-28007 Madrid
Tel.: 912.836.644
www.ibercampo.es

Peso Neto
300 G

Ref. 6157



Ref. LIG3KE
6496



8 410410 344335



Fabricado por Scotts France SAS
69136 Ecully Cedex - Francia
KB es una marca registrada
por Scotts France SAS