

FUNGICIDA ECOLÓGICO - COBRE NORDOX® 75WG es una formulación fungicida con alta contenido en cobre metal recomendada para el control preventivo de diversas enfermedades ocasionadas por hongos endoparásitos. Su presentación en forma de gránulos dispersables en agua permite una preparación de los caldos fácil y segura.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.S
Ajo, Cebolla, Chalote, Guisante verde, Judía verde, Haba verde, Hortalizas de Inoja, Tomate (2), Berenjena (2), Brécol, Coliflor, Cucurbitáceas, Tallos jóvenes (Cardos, Apio, Hinojo, Alcachofas y Puerros), excepto Espárragos	<i>ALTERNARIA, ANTRACNOSIS, BACTERIOSIS, MILDIU</i>	2 g/L (0,2%)	3
Frutales de hueso (1)	<i>ABOLLADURA, BACTERIOSIS, CRIBADO, MONILIA, MOTEADO</i>	2 g/L (0,2%)	NP
Frutales de pepita (1)	<i>BACTERIOSIS, MONILIA, MOTEADO</i>	1,5 g/L (0,15%)	NP
Cítricos	<i>BACTERIOSIS, FOMOPSIS, HONGOS ENDÓFITOS</i>	1,5 g/L (0,15%)	15
Patata	<i>MILDIU</i>	2g/L (0,2 %)	15
Lúpulo	<i>MILDIU</i>	2g/L (0,2 %)	15
Olivo	<i>REPILO, TUBERCULOSIS</i>	2 g/L (0,2%)	15
Ornamentales leñosas	<i>HONGOS ENDOFITOS, ROYAS</i>	2 g/L (0,2%)	NP
Vid	<i>BACTERIOSIS, MILDIU</i>	2 g/L (0,2%)	15

P.S: Plazo de seguridad (días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero ó entrada de ganados.

N.P.: No procede fijar plazo de seguridad.

MODO DE EMPLEO

Verter **FUNGICIDA ECOLÓGICO** en el tanque de pulverización mediado de agua, con el agitador en funcionamiento, y completar con el agua necesaria hasta su perfecta homogeneización. Aplicar en pulverización foliar normal. Para conseguir buenos resultados, debe realizarse una buena cobertura de todo el cultivo.

(1) En frutales de pepita y de hueso, efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1000 L de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo entre tratamientos de 14 días) y un máximo de 10 Kg de Cobre Nordox/ha por campaña.

(2) En tomate y berenjena, un máximo de 6 aplicaciones por campaña (con un intervalo entre tratamientos de 7 días) y un máximo de 7,5 kg de cobre inorgánico/ha por campaña. Plazo de seguridad: 10 días en cultivo al aire libre.

PRECAUCIONES

Debido a la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, no se recomienda la aplicación de COBRE NORDOX® 75WG en cultivos o variedades sensibles al cobre, en especial:

- Durante el período vegetativo de los frutales, tanto de hueso como de pepita.
- En viñedo y parrales de vid, durante la floración.
- En cucurbitáceas: melón, sandía, pepino, etc.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Valorar la realización de endoscopia digestiva.
- Control hidroelectrolítico.
- Controle la tensión arterial.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL, PENICILAMINA.
- Riesgo de alteraciones hepáticas y renales.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO: 91 562 04 20.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEÁSE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA.



Contenido neto: **50 gramos**

6908 6179

Lote de fabricación: Ver la base del envase
Fecha de fabricación: Ver la base del envase

KB es una marca registrada por Scotts France SAS

Distribuido por: **Ibercampo SL**
Agricultura, jardinería y paisajismo
Calle Cavanilles nº 32-1ºD
28007 Madrid - Tlf: +34.912.836.644
info@ibercampo.es
www.ibercampo.es
ibercampo



✓ **Protege Frutales, Hortalizas y Ornamentales**

✓ **Eficaz contra muchas enfermedades**



Naturen®

Fungicida Ecológico®

Cobre Nordox 75WG

2x25 g



FUNGICIDA ECOLÓGICO

COMPOSICIÓN

COBRE NORDOX 75WG
Óxido cuproso: 75% p/p (750g/kg)
(expresado en cobre)
Granulado dispersable en agua (WG)
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 22.560
Registrado por:
Comercial Química Massó S.A.
c/ Viladomat, 321 - 5º
SP-08029 Barcelona - T.+34 934 952 500
Fabricado por:

NORDOX NORDOX INDUSTRIERAS
Oslo (Noruega)



ATENCIÓN

H410 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P270 Evitar no comer, beber ni fumar durante su utilización.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales. Deposítelo en los puntos de recogida: SIG Punto Verde.

EUH 401 – A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

AUTORIZADO PARA SU USO EN JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Mamíferos: B Mediana peligrosidad para mamíferos

Aves: B Mediana peligrosidad para aves

Peces: B Mediana peligrosidad para peces

Abejas: Peligrosidad controlable para abejas. Para protección de las abejas, tapar las colmenas previamente al tratamiento y mantenerlas así durante 1 ó 2 horas más tarde.

GESTIÓN DE ENVASES

Inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seco y no contaminante.

Deposítelo en los puntos de recogida